


استئصال الزائدة



- عادة العملية تجرى لرفع الزائدة الملتهبة.
- الزائدة الملتهبة من الممكن أن تنفجر و تحرر بكتيريا أو غائط الى تجويف البطن.

الزائدة المنفجرة

- مع الاسف، الكثير من الناس لا يعرفون ان لديهم التهاب الزائدة الى ان تنفجر. إذا حصل ذلك، ستكون الحالة أكثر جدية وخطورة.
- نسبة الإصابة تكون أكثر في الأعمار الصغيرة جدا و الكبيرة جدا و تكون عالية عند الحمل. الأعراض (الغثيان، القيء، ألم في الجهة اليمنى من البطن) تكون مشابهة لحالة الحمل.

الخيارات

- رفع الزائدة ناظوريا: ترفع الزائدة باستخدام أدوات تمتد الى تجويف البطن من خلال فتحات صغيرة.
- رفع الزائدة بالفتح: ترفع الزائدة من خلال جرح في الجهة السفلى اليمنى من البطن.
- الخيار غير الجراحي: الجراحة هي العلاج المثالي لالتهاب المفاجيء في الزائدة. العلاج باستخدام المضادات الحيوية يمكن أن يستخدم في مرضى معينين وكذلك الاطفال.

الفوائد من العملية

العملية سترفع العضو الملتهب و تزيل الالم. بعد رفع الزائدة، لن يحدث التهاب الزائدة مجددا.

الخطورة من عدم إجراء العملية

الزائدة يمكن أن تنفجر، مسببة التهاب عام في تجويف البطن.

المضاعفات المحتملة من العملية

و تشمل: تكون خراج، التهاب الجرح أو تجويف البطن، انسداد الأمعاء، فتق في مكان الجرح، التهاب ذات الرئة، خطورة الولادة المبكرة (في حالة الحمل) و الموت.

المتوقع من العملية

- قبل العملية: من غير المسموح لك تناول الطعام أو شرب السوائل في فترة اعدادك لعملية رفع الزائدة الطارئة.
- التماثل للشفاء: ان لم يكن هناك أي مضاعفات، الرجوع إلى المنزل يكون خلال ١-٢ أيام بعد العملية سواء كانت ناظورية أو بالفتح.

اتصل بالجراح:

ان كان هناك ألم شديد، مغص في البطن، حمى عالية، رائحة او ازدياد نضح السوائل من الجرح و عدم وجود حركة للأمعاء لمدة ٣ أيام.

