


تصليح الفتق السروي للبالغ



- الفتق السروي يحصل عندما يندفع نسيج خلال فتحة في عضلات جدار البطن بالقرب من السرة.
- ازدياد الضغط داخل البطن يسبب الفتق السروي للظهور إلى الخارج.
- عندما تتحسب الأمعاء في كيس الفتق و التزويد الدموي ينقطع، تصبح الحالة حالة طارئة جراحية تتطلب عملية طارئة.

الاختيارات

- عملية تصليح الفتق المفتوحة: يعمل جرح بالقرب من الفتق. الإصلاح يتم باستخدام شبكة أو خياطة الطبقات العضلية.
- عملية تصليح الفتق الناظورية: يجري إصلاح الفتق بالشبكة أو الخياطة باستخدام أدوات تمر خلال جروح صغيرة في البطن.
- الخيار غير الجراحي: خيار المتابعة لا ينصح به للبالغ من

الممكن الانتظار للفتق الصغيرة جدا عندما يكون من الممكن ارجاعها و تكون غير مزعجة. عضلات البطن تصبح ضعيفة مع العمر، الفتق يمكن ان يكبر و يشكل خطرا عندما تتحسب الأمعاء و انقطاع التغذية الدموية (اختناق). عندما يحدث هذا يتطلب حينئذ عملية طارئة.

الفائدة من العملية

العملية الجراحية هي الطريقة الوحيدة لإصلاح الفتق. الرجوع للنشاطات الطبيعية يكون من الممكن من دون إزعاج.

الخطورة من عدم إجراء العملية

الفتق يمكن أن يسبب ألم و أن يزداد في الحجم. إذا انحسرت الأمعاء في كيس الفتق سيحصل ألم مفاجيء، تقياً حينها يحتاج إلى عملية طارئة.

المضاعفات المحتملة من العملية

رجوع الفتق، تجمع سوائل و دم، التهاب، إصابة المثانة أو الأوعية الدموية أو الأمعاء أو الأعصاب. من الممكن حصول ألم مستمر في مكان الفتق.

المتوقع من العملية

للإصلاحات البسيطة، الرجوع الى المنزل يكون في نفس اليوم. البقاء لفترة أطول من المحتمل أن يكون مطلوب للإصلاحات غير البسيطة.

الاتصال بالجراح

عندما يكون هنالك ألم شديد، ألم في البطن، ارتفاع للحرارة مع رجفة، رائحة أو ازدياد في سوائل الجرح أو عدم وجود حركة في الأمعاء لمدة ٣ أيام.

