

استئصال القولون

و هي عملية رفع جزء من القولون او الامعاء الغليظة.

الخيارات

- **الرفع بالفتح:** يعمل جرح في البطن و جزء القولون المصاب يرفع. النهايتين الحرتين من القولون تخط معا أو تكبس. أن تعذر دمج النهايتين، فالنهاية الحرة تجلب إلى سطح البطن على شكل تفويه القولون.
- **الرفع بالناظور:** كاميرا مزودة بضوء، مع أدوات تدخل إلى تجويف البطن عن طريق فتحات صغيرة و تتم إزالة القولون المصاب.
- **الخيار غير الجراحي:** بعض امراض القولون تعالج باستخدام المضادات الحيوية، ادوية ستيرويدية و ادوية تؤثر على المناعة.

الفوائد من العملية

إزالة الجزء المصاب من القولون يزيل الأعراض المصاحبة و يقلل من خطر الموت من السرطان.

المضاعفات المحتملة من العملية

مشاكل وقتية في الأمعاء من الممكن أن تحتاج لتفويه، تسريب من القولون الى تجويف البطن، مشاكل في الرئة و تشمل التهاب ذات الرئة، التهاب في الجرح، او في الدم او في المجاري البولية، تخثر الدم في الأوردة و الرئة، نزيف، ناسور و الموت.

المتوقع من العملية

في يوم العملية: سوف لن تأكل لمدة ٤ ساعات و لكن ممكن شرب السوائل إلى حد ساعتين قبل العملية. ادوية لتنظيف الأمعاء مع مضادات حيوية يبدأ بها قبل يوم من العملية. من الممكن أخذ الأدوية المعتادة قبل العملية مع شربة ماء.
التمائل للشفاء: البقاء في المستشفى يكون لمدة ٣ أيام لرفع القولون الناظوري أو الفتح. الوقت من حركة الأمعاء الأولى إلى الأكل الطبيعي يستغرق ٣-٤ أيام.

أتصل بالجراح

ان كان هناك غثيان و قيء مستمرين، تسريب من الجرح، دم مع الغائط، ألم شديد، ألم في البطن، رجفة مع حمى عالية، رائحة و نضوح سوائل كثيفة من جرح، انتفاخ في البطن، او عدم وجود حركة في الأمعاء لمدة ٣ أيام.

