


إصلاح الفتق المغبني



- الفتق يحدث عندما يكون هناك نسيج يندفع الى الخارج خلال فتحة بين عضلات البطن تحت الجلد.
- أي جزء من جدار البطن من الممكن أن يصبح ضعيفا و يعاني من فتق، و لكن أكثر الأمكنة حدوثا هي المنطقة المغبنيّة، السرة و مكان جرح سابق.

الخيارات

- **إصلاح الفتق بالفتح:** يعمل جرح بالقرب من مكان الفتق و يصلح الفتق باستخدام شبكة أو خياطة العضلات.
- **إصلاح الفتق بالناظور:** الفتق يصلح باستخدام شبكة أو خيوط تدخل بواسطة أدوات من خلال فتحات صغيرة في البطن.
- **الخيار غير الجراحي:** الانتظار والمراقبة يعتبر خيار آمن و مقبول للبالغين للفتق المغبني غير المسبب للازعاج. معظم المرضى يعانون من الأعراض خلال سنة أو اثنين و يحتاجون إلى الجراحة بسبب ازدياد الألم عند الإجهاد، القبض المزمن أو احتباس الادرار.

الفوائد من العملية

العملية هي الطريقة الوحيدة لإصلاح الفتق. يمكن العودة إلى الفعاليات الطبيعية وفي معظم الحالات لن تكون هناك أي إزعاج آخر.

المضاعفات المحتملة من العملية

رجوع الفتق، التهاب، إصابة المثانة، الأوعية الدموية، الأمعاء أو الأعصاب، صعوبة الادرار، استمرار الألم و تورم في الخصية والمنطقة المغبنيّة.

الخطورة من عدم إجراء العملية

الفتق من الممكن أن يسبب ألم أو ازدياد في الحجم. أن انحسرت الأمعاء في كيس الفتق (تورم سيصبح الألم مفاجيء مع قيء و بذلك يحتاج إلى عملية طارئة.

المتوقع من العملية

ان لم يكن هناك مضاعفات، العودة للمنزل تكون في نفس اليوم.

اتصل بالجراح

إن حدث ألم شديد، ألم في البطن، رجفة مع حمى عالية، رائحة أو ازدياد نضح الجرح أو عدم وجود حركة للأمعاء لمدة ٣ أيام.





د. زيد زهير الاشيقر
اختصاصي الجراحة العامة
MB, ChB MD FICMS

