


## تصليح الفتق المغبني للاطفال



- الفتق يحدث عندما يندفع نسيج خلال فتحة بين عضلات البطن.
- يمكن لأي جزء من جدار البطن ان يضعف و يعاني من فتق، لكن اكثر الانواع شيوعا هو الفتق المغبني، و السروي و الذي يحصل من ندبة جرح قديم.

### الخيارات

- **إصلاح الفتق بالفتح:** يعمل جح بالقرب من الفتق و يصلح الفتق باستخدام شبكة او خياطة العضلات معا.
- **إصلاح الفتق ناظوريا:** الفتق يصلح باستخدام شبكة او خيوط تدخل بأدوات تمر من فتحات صغيرة الى البطن.
- **الخيار غير الجراحي:** الفتق المغبني لا يزول من ذات نفسه. ينصح بالجراحة دائما بسبب الخطورة العالية من اختناق الامعاء الداخلة في كيس الفتق.

### الفوائد من العملية

العملية هي الخيار الوحيد لاصلاح الفتق. يمكن الرجوع للفعاليات الحيوية وفي معظم الحالات بدون أي انزعاج آخر من الحالة.

اختصاصي الجراحة العامة

### المضاعفات المحتملة من العملية

رجوع الفتق، والتهاب، إصابة المثانة، الأوعية الدموية، الأمعاء و الأعصاب، صعوبة الادرار، استمرار الألم، و تورم الخصية والمنطقة المغبنيّة.

### الخطورة من عدم إجراء العملية

الفتق قد يسبب ألم أو يزداد في الحجم. أن انحسبت الأمعاء في كيس الفتق، سيكون هناك ألم مفاجئ و قيء و يحتاج الى عملية طارئة. من الممكن أن يحصل تقليل التغذية الدموية للخصية عند الذكور او ضرر في الأمعاء.

### المتوقع من العملية

ان لم يكن هناك مضاعفات يمكن الرجوع إلى المنزل في نفس اليوم.

### اتصل بالجراح

ان كان هناك ألم شديد، مغص في البطن، رجفة مع حمى عالية، رائحة مع ازدياد نضح الجرح، أو هناك عدم حركة للأمعاء لمدة ٣ أيام.

