


تصليح الفتق السروي للأطفال



الفتق يحدث عندما يندفع كيس يحتوي على نسيج خلال فتحة في عضلات جدار البطن.

الفتق السروي يحدث بسبب عدم انغلاق العضلات حول الفتحة المتروكة من الحبل السري. يمكن ان يحدث هذا فوق السرة وحول السرة.

الخيارات

- **إصلاح الفتق بالفتح:** يعمل جرح بالقرب من الفتق. الإصلاح يتم باستخدام شبكة او خياطة العضلات معا.
- **الخيار غير الجراحي:** العديد من الفتوق السروية الصغيرة (بحجم ١,٥-١ سم) تنغلق من ذات نفسها خلال فترة نمو الطفل من الولادة إلى ٤ سنوات لذلك لا تحتاج الى تصليح الجراحي. ان لم يتم الانغلاق الذاتي خلال هذه الفترة فالجراحة تكون مطلوبة قبل عيد الميلاد الخامس للطفل.

الفوائد من العملية

العملية هي الطريقة الوحيدة لتصليح الفتق الذي لم ينغلق من ذات نفسه. يستطيع الطفل الرجوع إلى النشاطات الطبيعية في وقت قصير في معظم الحالات الانزعاج من العملية ستنقى لأيام قليلة.

الخطورة من عدم إجراء العملية

الفتق قد يسبب ألم أو يزداد في الحجم. ان انحبست الأمعاء في كيس الفتق، سيحدث ألم مفاجيء مع قيء و حينها يحتاج إلى عملية طارئة.

المتوقع من العملية

طفلك في أغلب الأحيان سيعود إلى المنزل خلال ساعات بعد الإفاقة من التخدير لعمليات الفتوق الصغيرة و لكن من الممكن البقاء لفترة أطول للإصلاحات المعقدة.

اتصل بالجراح

ان كان هناك ألم شديد، مغص في البطن، رجفة مع حمى عالية، رائحة مع ازدياد نضح الجرح، أو هناك عدم حركة للأمعاء لمدة ٣ أيام.

